

## לוח ערלה לפירות קיץ - תשע"ו

### ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
אגס ס"ה			140	17180	0.07
ג'נטיל	קטן, צהוב	יוני	-	200	-
אטרסקה	גדול, מאורך, ירוק אדום	יוני, יולי	10	280	0.3
קוסטיה	מאורך, צהוב, לחי אדומה	יולי	40	2600	0.08
ספדונה (וספדוצ'ינה)	ירוק בהיר, צואר קצר	יולי, אוגוסט	90	14000	0.1
ברטלט	ירוק או אדום, גדול, רוב ייבוא	אוגוסט	-	50	-
נאשי (יפני או סיני)	דומה לתפוח	אוגוסט	-	50	-

בקיץ תשע"ו עדיין יהיו בשוק פירות שהם משנה השביעית, קדושים בקדושת שביעית וכבר עבר זמן ביעורם. לכן יש לקחתם אך ורק בחנויות/במקומות שיש עליהם השגחה לדיני שביעית. כמו כן כל הפירות המיובשים כגון צימוקים, תמרים, ושימורי פירות כגון זיתים, שמן זית צריך לבדוק אם הם מהשנה השביעית. כאמור גם פירות חיים [טריים] של שביעית יהיו בשוק כגון אגסים, תפוחים, אבוקדו, קיוי, פירות הדר.

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	ערלה אחוז
אוכמניות <sup>1</sup>	סגול, מעוגל ומעט שטוח, קטן, חלק. הרבה פירות מסורים	אוגוסט עד אוקטובר		100	130!
אנונה		אוגוסט עד פברואר	10	700	0.45
אפרסק ס"ה			1087	31500	1.24
ארלי ספרינג	ציפה צהובה	אפריל, מאי	40	2500	0.6
טקסס	ציפה צהובה, גדול	אפריל, מאי	20	1400	0.48
אלמוג	ציפה לבנה	סוף אפריל עד מאי	-	700	-
ווייט ספרינג (1270)	ציפה לבנה, דומה לאלמוג	סוף אפריל עד מאי	122	500	9.8
פלורדגלו (9-82)	דמוי סוולינג, ציפה לבנה, גדול	מאי, יוני	-	50	-
עודד (10 ג' 87)	ציפה לבנה, דומה לסוולינג	יוני	170	5500	1.2
סוולינג (רודס)	ציפה לבנה, גדול	יוני	200	3700	1.6
בבקוק	דמוי סוולינג, ציפה לבנה, קצה חד	יוני	-	350	0
שוגר ווייט לידי	כמו בבקוק אך גדול	יולי	15	2500	0.2

<sup>1</sup> בזן זה קיים רוב ערלה או חשש ל"קבוע" - שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	ערלה אחוז
סמרסנאו	כמו בבקוק אך גדול	יולי	290	5200	2.23
הרמוזה	ציפה לבנה, מאורך, גדול	יולי, אוגוסט	30	3000	0.38
198-12 ורובידו	דמוי סמרסט, צהוב עם לחי אדומה	יולי, אוגוסט	-	50	-
סמרסט ופיירטיים	ציפה צהובה, גדול מאוד	ספטמבר	-	50	-
ספטמבר וסקרלט סנאו	ציפה לבנה	ספטמבר	200	6500	1.25

נקטרינה (אפרשזיף)			1190	23900	2.2
רדגלו	ציפה צהובה, קטן עד בינוני	אפריל, מאי	-	150	-
מאיגלו	ציפה צהובה, קטן עד בינוני, אדום מבריק	מאי	-	700	-
פיאסטרד, וכן ג'יסי 100	ציפה צהובה	מאי	-	50	-
11-9 וכן סנרד	ציפה צהובה, בינוני	מאי	-	50	-
גלי	ציפה לבנה	מאי	40	2000	0.6
סן סנאו	ציפה לבנה	מאי	50	2000	0.6
סן לייט	ציפה צהובה, בינוני	יוני	-	150	-

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	ערלה אחוז
15-5	ציפה צהובה, בינוני	יוני	200	3000	3.3
סנואו קווין	ציפה לבנה, בינוני	סוף יוני	-	400	-
ארטיגלואו, קווין ג'אנט, סויטי	ציפה לבנה, בינוני	יולי	150	3600	1.9
אינדפנדס, נקטרד, ארלי סנגרנד, פלברטופ	ציפה צהובה	יולי	-	700	-
פנטזיה	ציפה צהובה, גדול	סוף יולי עד אוגוסט	100	2000	1.7
פליימקיס	ציפה צהובה, גדול	אוגוסט	-	50	-
פרליין	ציפה צהובה, גדול	אוגוסט, ספטמבר	-	200	-
אוטמפרי	ציפה צהובה, גדול	אוגוסט, ספטמבר	-	100	-
הוניגולד	ציפה צהובה, קטן, צהוב	ספטמבר	-	50	-
זנים חדשים אפילים	ציפה לבנה, גדול	אוגוסט, ספטמבר	650	8700	3.7

באבאקו	ראה פאפיה
--------	-----------

גויאבה <sup>2</sup>	יתכן יבול גם מסורים	ספטמבר- אוקטובר	90	2200	0.65-0.75
---------------------	---------------------	-----------------	----	------	-----------

<sup>2</sup> חלק מהיבול גדל אצל נכרים (ספק ערלה מנכרים קל יותר).

המכון לחקר החקלאות עפ"י התורה  
לוח ערלה / ד"ר מושה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
גויאבה תותית	פרי קטן	מספטמבר עד נובמבר	4	24	2
דובדבן (חמוץ) <sup>2</sup>		יוני, יולי	10	250	-
גודגדן (מתוק) <sup>2</sup>		יוני, יולי	100	5000	-
זית מאכל (גדול) <sup>2</sup>	שימורים כל השנה	ספטמבר, אוקטובר	100	21800	0.13
זית לשמן ס"ה <sup>2</sup>	השווק נמשך שנה ויותר	ספטמבר עד דצמבר	2000	66000	0.74
סורי ועוד <sup>2</sup>	גודל בינוני, הנפוץ		1900	55500	1
ברנע (ודמיו)	בעיקר לשמן, גדול וקצת מחודד (שמן נחות)		100	10500	0.36
חבוש		ספטמבר עד דצמבר	10	500	0.36
חרוב	אין פרי ערלה	אוקטובר עד דצמבר			-
ליטשי	פרי אדום	יוני עד אוגוסט	190	3300	0.53

<sup>2</sup> חלק מהיבול גדל אצל נכרים (ספק ערלה מנכרים קל יותר).

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	ערלה אחוז
לונגן	פרי דומה לליטשי אך בצבע חום	כמעט ואין ערלה			

לימון		אפריל עד נובמבר	2800	25000	2
לימה (ליים)	קטן, ירוק, מעט רחב פחוס	יולי עד נובמבר	70	1100	0.51
לימקוטט	צורת לימון קטן ומאורך, ירוק צהוב	יולי עד נובמבר	-	60	-

מישמש ס"ה		מאי, יוני	310	8500	0.8
רעננה		יוני	160	6100	0.62
330 ושונים	אדומים או גדולים, ובכירים	מאי, יוני	150	2400	1.25

מנגו	וכן ספוטה, מעט מאד בשוק	יולי עד נובמבר	600	19000	0.1
------	-------------------------	----------------	-----	-------	-----

נקטרינה ראה אחרי אפרסק

ענבים ללא חרצנים ס"ה			1960	30185	1.4
מחממות (125 ס.ב.ס.)	אשכול לא צפוף, ענב ירוק	סוף מרץ עד סוף מאי	100	1250	3.1

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
פרלט באיזור מקדים	צהוב, קטן, עגול	מאי עד יולי	-	50	-
670	אדום כהה, קטן עד בינוני	מאי עד יולי	-	50	0
125 (פריים) כולל ס.ב.ס, ארלי סוויט	אשכול לא צפוף, ענב ירוק	מאי, עד יולי	300	7000	1.1
108 (מסטרי)	דומה ל 125 אך קצת מאורך	יוני, יולי	50	1600	0.8
סופיריור	ירוק, גדול, מעוגל	יוני עד אוגוסט	432	6000	1.4
פליים סידלס	אדום	יוני עד אוגוסט	50	800	1.5
637 (ספרינג בלאש)	אדום כהה, מאורך	יוני, יולי	-	50	-
אדומיניק	אדום כהה	יוני, יולי	-	45	-
סייבל	שחור בינוני	אוגוסט	80	550	3.6
יערה	שחור, לא גדול	יוני עד אוגוסט	-	50	-
מידנייט <sup>1</sup>	שחור מאורך (כנראה הרוב בפיקוח)	יולי	45	400	2.8
זנים נסיוניים	(כנראה הרוב בפיקוח)		100	400	6.2

<sup>1</sup> בזן זה קיים רוב ערלה או חשש ל"קבוע" - שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	ערלה אחוז
רוקי (253)	ירוק	יולי	90	400	5.6
מליסה	ענב לבן מאורך, נטיעה נסיונית (כנראה בפיקוח)	יולי עד ספטמבר	28	90	7
סולטנינה (תומפסון)	ירוק, צהוב, מאורך	יולי עד נובמבר	50	7400	0.1
קרימסון	אדום ענב בינוני	אוגוסט, ספטמבר	75	2600	0.54
664 וזן חדש אוטם קריספ	ענב לבן מאורך, נטיעה נסיונית (הרבה בפיקוח)	אוגוסט, ספטמבר	408	70	!68
אוטם רויאל	ענב שחור, נסיונית (כנראה בפיקוח)	אוגוסט, ספטמבר	62	270	4.6
בלק פינגר (149)	שחור גדול וארוך	ספטמבר	-	110	-
סקרלוטה	אדום, גדול, אובלי	ספטמבר, אוקטובר	140	1000	2.8

ענבים עם חרצנים ס"ה			246	7410	0.56
קרדינל	שחור	אמצע מאי, יוני	-	50	-
דן בן חנה	שחור	אמצע מאי עד יולי	4	200	0.24
ורד	אדום	יולי	-	100	-

<sup>1</sup> בזן זה קיים רוב ערלה או חשש ל"קבוע" - שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.



המכון לחקר החקלאות עפ"י התורה  
לוח ערלה / ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	ערלה אחוז
בונייר	שחור	יולי	-	100	-
מוסקט המבורגי	אדמדם-אדום, טעם מוסקטי	יוני עד אוגוסט	5	600	0.2
דבוקי	צהוב	אוגוסט, ספטמבר	-	200	-
איטליה	ירוק, גדול, מוסקט	אוגוסט, ספטמבר	-	100	-
זאני (ומעט מהזן אלול)	ירוק בהיר, גדול, אליפטי	ספטמבר, אוקטובר	200	3000	1.1
חילוואני (אדום)	כולל שאמי וברלינקה (שחור)	ספטמבר, אוקטובר	-	300	-
רד גלוב	אדום סגול, גדול עגול	ספטמבר, אוקטובר	20	3000	0.1
אוטם בלאק	שחור	אוקטובר	17	60	4.7

פאפיה רוב ערלה!	עגול מאורך ירוק		15		!80
פג'ואה		נובמבר, דצמבר	-	25	-
פיטאיה ס"ה	קקטוס, פרי בצורת ביצה		25	470	1.6
פיטאיה (זוחלת)	צהובה עם ציפה הלבנה	דצמבר עד מרץ	-	30	-

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
פרי עדן	אדום וגם לבן, בליטות צבעוניות	מאי עד דצמבר	15	340	1.8
פיטאיה עמודית (קובו)	חלקה ופרי קטן יותר, גם מ"סורים"	יוני עד ספטמבר	10	120	0.4-0.6

פסיפלורה	ראה שעונית
----------	------------

צבר	קיים חשש להשתרשות צמחי בת, יש בפיקוח	425	4800	3.1-4
-----	--------------------------------------	-----	------	-------

נפוליטוס	מין צבר שעליו נאכלים - אין מידע ברור, מרביתה חלקות מעבר לשנות ערלה. קיים ספק אם יש בו בכלל דין ערלה.
----------	--

קומקואט	דצמבר עד מאי	2	400	0.1
---------	--------------	---	-----	-----

קיוי (אקטנידיה)	צורת ביצה, חום אדום	ספטמבר עד ינואר	40	1860	0.2
-----------------	---------------------	-----------------	----	------	-----

קרמבולה <sup>1</sup>	צהוב ירוק, דמוי פלפל וצלעות	ספטמבר עד אפריל	10	68	15
שזיף אירופי	מאורך	אוגוסט עד אוקטובר	50	1800	0.3
שזיף יפני ס"ה	עגול		644	18880	0.43

<sup>1</sup> בזן זה קיים רוב ערלה או חשש ל"קבוע" - שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.

המכון לחקר החקלאות עפ"י התורה  
לוח ערלה / ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	עולה אחוז
רויאלזי	קטן, אדום, פחוס	מאי	80	3000	0.51 0.4 0.8 -
מטלי	קטן, אדמדם, עגול	מאי	100	1300	
רד ביוט	בינוני אדום, פחוס	מאי, יוני	-	300	
אוגדן	צהוב, עגול	יוני	30	1210	0.36
מריפוזה	ציפה אדומה, קצת אליפטי	יוני	-	50	-
ויקסון	ירוק צהוב, קצת מאורך	יוני, יולי	4	300	0.2
קלסי	ירוק, חלל בקצה גלעין	יולי	-	300	-
לרודה, נוביאנה, אמברה, בלק אמבר	סגול	יולי	-	1000	-
בלק דיימונד	שחור, ציפה אדומה, גדול	יולי	80	3000	0.36
קוין רוזה	ארגמן, גדול	יולי	-	300	-
פרייר	גדול, פחוס, כהה	יולי	-	800	-
סנגולד	ירוק צהוב, עגול	יולי	80	2200	0.46

מין רזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	ערלה אחוז
קסלמן	אדום, קצת מאורך	יולי	-	50	-
ניו יורקר	שחור	סוף יולי	20	520	0.46
גולדן קינג	צהוב, קטן	אוגוסט	-	200	-
אנג'לנו	פחוס סגול, (דומה לזן נוביאנה אך לא כהה)	אוגוסט	-	400	-
רדרוזה	ארגמן, עגול, גדול יחסית	אוגוסט	-	50	-
בלק ג'ם (440)	שחור, ציפה בהירה, גדול	ספטמבר	250	3900	0.71

שיזף		אוגוסט עד אוקטובר	1	300	0.1
------	--	-------------------	---	-----	-----

שסק		אפריל עד מאי	70	2800	0.2
-----	--	--------------	----	------	-----

שעונית <sup>1</sup> (פסיפלורה)		פברואר עד ספטמבר	230	1200	!40
-----------------------------------	--	------------------	-----	------	-----

שקד <sup>2</sup>	היבול בפרי קלוף - גלעין, הרוב ייבוא	ספטמבר עד נובמבר	2820	38000	1.3
------------------	-------------------------------------	------------------	------	-------	-----

<sup>1</sup> בזן זה קיים רוב ערלה או חשש ל"קבוע" - שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.

<sup>2</sup> חלק מהיבול גדל אצל נכרים (ספק ערלה מנכרים קל יותר)

המכון לחקר החקלאות עפ"י התורה  
לוח ערלה / ד"ר משה זקס

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
תאנה ס"ה	יש גם יבוא ומנכרים		160	2700	0.94
ארגמנית		מאי עד דצמבר	130	1600	1.1
שאר זנים <sup>2</sup>		מאי עד נובמבר מעט במאי הרבה באוגוסט עד אוקטובר	30	1100	0.6
תות עץ	מעט, אין יבול ערלה				-
תמר יבש		ספטמבר עד נובמבר משווק כל השנה	1250	18000	0.2
תמר לח		אוקטובר עד ינואר משווק כל השנה מהקפאה	15	4200	0.1
תפוח ס"ה			1340	45200	0.42
תפוחים בכירים					
ענה	מאורך לא מוצק	יולי	100	4000	0.6 } 0.7 } 0.5 }
בכירים שונים (א2, 60א, 11-9)		יולי, אוגוסט	20	500	

<sup>2</sup> חלק מהיבול גדל אצל נכרים (ספק ערלה מנכרים קל יותר).

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
תפוח רגיל ס"ה ללא הבכירים הנ"ל.			1220	40700	0.4
זנים ללא שמירה רבה בקירור (כרגיל אינם מצויים כלל לאחר פברואר)					
גרנד	תפוח ירוק (כמו גרני סמית)	יולי עד ספטמבר	10	200	0.5
אין כמוהו	שטוח	אוגוסט	-	100	-
אורליאן	פסים אדומים, קצת מאורך	אוגוסט עד אוקטובר	-	2000	-
להלן רשימת הזנים הרגילים המשווקים מקירור כל השנה, לגביהם מובא במספר הראשון אחוזי הערלה עד ינואר שהוא לפרי מקירור לזמן קצר, ואחריו אחוזי הערלה מינואר (בגרני סמית מפברואר) מקירור ממושך					
גלה	קצת פחוס, ירוק עם מעט פסים אדומים	אוגוסט עד אוקטובר	150	4000	1.9 0.1
מולינג דלישס	פחוס, צבעוני	אוגוסט עד אוקטובר	-	400	-
יונתן (כולל גר'ני)	אדום, ציפה קשה יחסית, לא גדול	אוגוסט עד אוקטובר	60	1600	1.5 0.1
דלישס אדום (חרמון, טופרד) <sup>2</sup>	אדום מאורך כולל זן חדש אורגון ספר 2 הדומה לו	אוגוסט עד אוקטובר	100	10000	0.2 0.05
זהוב <sup>2</sup>	קליפה צהובה עם נקודות שחורות קטנות	אוגוסט עד אוקטובר	150	10000	0.5 0.1

<sup>2</sup> חלק מהיבול גדל אצל נכרים (ספק ערלה מנכרים קל יותר).

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	אחוז ערלה
גרני סמית	ירוק, גדול	ספטמבר עד נובמבר	350	10000	1.8 0.2
פינק ליידי	ורוד וצהוב, יש גם ייבוא	ספטמבר	400	2400	8 0.3

הערה: בהדרים וכן באבוקדו כמעט כל השתילים הינם דו שנתיים (וכן חלק ניכר מהאפרסק, נקטרינה, תפוח וחלק מאפרסמון וענבים). כן קיים פיקוח על המגדלים דרך בתי האריזה המטפלים כמעט בכל היבול הארצי בכמעט כל ההדרים והאבוקדו (גם בתפוח רגיל ועוד). למרות שמעיקר הדין יש לחשב גם את שנת המשתלה לענין ערלה, אנחנו ממשיכים לציין בלוחות את שיעור הערלה האפשרי ללא חישוב הנטיעות הדו שנתיים וללא התחשבות בהשגחה. וזאת כיוון שיש בכך מידע המועיל אף להשגחות מהדרין שאינם מסתמכים על גידול דו - שנתי, וכיוון שקיימת גם אפשרות לערלה במעט שמחוץ לשיווק המאורגן. כמובן, אם מתחשבים בנטיעות הדו שנתיים ובהשגחה, שיעור הערלה יהא קטן בשיעור ניכר מהמופיע בטבלה במינים אלה, ובפרט בהדרים.



## לתועלת הציבור

בית המדרש מפרסם מידע חודשי על אחוזי הערלה המצויים בשוק.  
במשרדי "בית המדרש" בטלפון 02-6488888 שלוחה 3.

המידע מבוסס על לוחות אחוזי הערלה הכלליים המתפרסמים  
ב"הליכות שדה" בעריכת ד"ר משה זקס.